



ENJEU DE CONSERVATION EN RÉGION PACA

MOYEN

Habitat souvent ponctuel


Habitat d'intérêt communautaire

Roches siliceuses avec végétation pionnière du *Sedo-Scleranthion* ou du *Sedo albi- Veronicion dillenii*

Milieux
rocheux

CODE EUR
H8230

Correspondance cahiers d'habitats : 8230-1 / Corine biotope : 36.2



Description

Cet habitat correspond à des pelouses rases, écorchées, assez recouvrantes (50 à 80 %), dominées par des plantes grasses, des vivaces et de nombreuses plantes annuelles. Ces pelouses se développent sur des rochers affleurant des plateaux et des vallons ou à la surface de rochers déposés par les glaciers, ou plus rarement dans des vires rocheuses. Cet habitat est également composé de mousses et lichens dont le recouvrement peut être important. Les plantes caractéristiques de cet habitat sont par exemple des Rumex, des Scléranthes, des Orpins, des Joubarbes...

Situation en PACA :

Cet habitat est présent dans les Alpes-de-Haute-Provence (Ubaye), les Hautes-Alpes (Briançonnais, Champsaur-Valgaudemar, Oisans et Ubaye) et les Alpes-Maritimes (Tinée et Vésubie). Il est également signalé dans les Bouches-du-Rhône et dans le Var (Maures-Estérel).

Etat de conservation en France

MEDIT	ALPIN
inadéquat	inadéquat



Joubarbe dans des anfractuosités rocheuses - Photo : CBNA, DOCOB Emparis



Petites taches de végétation pionnière à Joubarbes des montagnes sur lithosols en mosaïque avec les pelouses acides - Photo : ONF, DOCOB Ubaye

Facteurs de vulnérabilité

- habitat très dispersé et en général de faible surface.
- habitat sensible à l'enrichissement et à la fermeture des milieux.
- flore spécialisée, adaptée à des périodes importantes de sécheresse.

Principales pratiques susceptibles d'avoir des incidences

- travaux d'aménagements (ouverture de carrière, création de pistes).
- arrêt des pratiques pastorales (fermeture du milieu) ou mauvaise gestion pastorale (piétinement par le bétail et enrichissement en matières organiques).

Actions favorables

- maintien d'un pâturage occasionnel par les herbivores.
- restauration : élimination des ligneux portants ombrage à l'habitat, opérations ponctuelles de gyrobroyage et de débroussaillage.
- canalisation de la fréquentation touristique.

Liens utiles

DOCOB : www.side.developpement-durable.gouv.fr

Fiches INPN + cahiers d'habitats : <http://inpn.mnhn.fr>

DREAL : <http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/natura-2000-r167.htm>

ETAGE DE VEGETATION

3000 m	NIVAL
2100 m	ALPIN
1600 m	SUBALPIN
900 m	MONTAGNARD
600 m	SUPRA-MEDITERRANEEN
100 m	MESO-MEDITERRANEEN
0 m	THERMO-MEDITERRANEEN