**Description**

Cet habitat correspond à un paysage à dominance minérale (champ de lapiés = grandes dalles rocheuses érodées), parfois très étendu et dont le recouvrement végétal est faible à nul car le sol y est généralement absent ou très pauvre. La roche calcaire fissurée offre un grand nombre de petites anfractuosités dans lesquelles peuvent se développer des mousses, des fougères voir même des plantes de pelouses ou des arbustes isolés.

Situation en PACA

Cet habitat est mal connu mais semble localisé dans de nombreux massifs :

- Hautes-Alpes : Haut-Buech (secteurs localisés), Dévoluy, fragmentaire dans le Briançonnais (Cerces-Galibier, Clarée, Haute-Durance), le Queyras et l'Embrunnais (Oucane de Chabrières) et le Champsaur (haute vallée du Tourond).
- Alpes-de-Haute-Provence : Grande Séolane, lapiés du Pas-de-Galabre-Lauseron (surfaces restreintes), Haute Ubaye et Haut Verdon.
- Alpes-Maritimes : Marguareis, Plateaux de Caussols et de Calern.
- Var : Sainte-Baume et Rocher des Quatre Confronts (plateau de Montrieux).
- Bouches-du-Rhône : Montagne Sainte-Victoire (surfaces restreintes).

Etat de conservation en France

MEDIT	ALPIN
favorable	favorable



Végétation installée dans les anfractuosités d'un lapiéz - Photo : ONF, DOCOB Marguareis




Photo : ONF, DOCOB Marguareis

Liens utiles

DOCOB :
www.side.developpement-durable.gouv.fr

Fiches INPN + cahiers d'habitats :
<http://inpn.mnhn.fr>

DREAL :
<http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/natura-2000-r167.htm>

Facteurs de vulnérabilité

- habitat globalement assez stable et peu menacé, sauf ponctuellement par des destructions directes irréversibles (aménagements, carrières...) ou par la fermeture des milieux.

Principales pratiques susceptibles d'avoir des incidences

- travaux d'aménagements (ouverture de carrière, création de pistes).
- arrêt des pratiques pastorales (fermeture du milieu).

Actions favorables

- maintien du caractère minéral de l'habitat.
- maintien d'une activité pastorale.