



**Effectif national :**  
 Entre 971 et 20 860 couples entre 2019 et 2024

**Effectif régional en PACA :**  
 Entre 971 et 20 860 couples entre 2019 et 2024

## Tendances nationales nicheurs

	Court terme		Long terme	
<b>Effectif</b>	↗	50 %	F	-0,62 %
<b>Répartition</b>	→	0 %	→	0 %

Patrinat (2025). F = fluctuant.

## Distribution en PACA

En PACA, le Flamant rose se reproduit exclusivement en Camargue (Bouches-du-Rhône). Régulièrement, quelques couples effectuent des tentatives de reproduction sur d'autres zones humides côtières, comme les salins d'Hyères, mais sans succès jusqu'à présent. En 2014, la colonie de reproduction s'est déplacée dans le département voisin du Gard, sur les salins du Midi à Aigues-Mortes. En dehors de la reproduction, le Flamant rose s'observe sur toutes les zones humides côtières, avec des effectifs variant de quelques individus à plusieurs milliers.

## Description

Le Flamant rose est un grand échassier présentant un plumage rose pâle sur le corps, excepté les ailes qui ont un contraste marqué entre les couvertures roses vives et les rémiges noires. Les jeunes sont gris et acquièrent progressivement leur plumage adulte en quelques années.

## Écologie & principaux habitats

Le Flamant rose est l'oiseau emblématique de la Camargue. Il se reproduit en grande colonie comptant jusqu'à 20000 couples certaines années. Il fréquente les îlots entourés d'eau qui lui procurent protection contre les prédateurs terrestres. Dès le mois de novembre, les oiseaux commencent à parader. Il s'agit d'une danse ritualisée qui mêle mouvements de têtes, postures d'accouplements et de toilettes. Les flamants roses sont monogames et changent de partenaires chaque année. En avril, la femelle pond un œuf dans un nid rudimentaire constitué de boue. L'incubation dure 30 jours et est assurée par le mâle et la femelle. Rapidement après l'éclosion, les jeunes quittent le nid et se rassemblent en crèche, surveillés par quelques adultes. Le succès reproducteur est très variable chez cette espèce, qui peut abandonner facilement sa nichée. En effet, la présence de prédateurs ou de niveaux d'eau trop bas peuvent entraîner l'échec de la reproduction, tout comme des niveaux d'eau trop hauts qui noient la colonie. Pour se nourrir, cette espèce fréquente les lagunes d'eau saumâtre et salée.



## Habitats préférentiels

Minéraux	Herbeux	Arbustifs	Forestiers	Humides	Agricoles
				Lagunes saumâtres, salins, marais	Rizières

## Zones de protection spéciale où l'espèce est présente

Statut biologique	ZPS concernées
<b>Nicheur certain</b>	Camargue (FR9310019)
<b>Nicheur probable</b>	Salins d'Hyères et des Pesquiers (FR9312008)
<b>Nicheur possible</b>	/
<b>Passage / hivernant</b>	Basse vallée du Var (FR9312025), Crau (FR9310064), Étangs entre Istres et Fos (FR9312015), Garrigues de Lancon et Chaines alentour (FR9310069), Iles d'Hyères (FR9310020), Iles Marseillaises (FR9312007), La Durance (FR9312003), Marais entre Crau et Grand Rhone (FR9312001), Montagne Sainte Victoire (FR9310067), Petite Camargue laguno-marine (FR9312013), Plateau de l'Arbois (FR9312009), Salines de l'Étang de Berre (FR9312005)

# Enjeu de conservation en région PACA

Espèce protégée*	
Liste rouge nationale	VU
Liste rouge régionale	VU

\* Statuts détaillés en annexe

## Risques

	Caractéristiques du projet	Sensibilité	Risques
Bruit	Bruit (engins motorisés, chantier...)	Reproduction	Dérangement des colonies
	Fréquentation humaine conséquente (bruit, piétinement...)	Reproduction	Risque de dérangement à proximité des sites de reproduction
Eaux	Modification des eaux souterraines (pompage, pollution...)	Reproduction	Variations des niveaux d'eau susceptibles de noyer les nichées
	Modifications des eaux de surfaces (drainage, turbidité, curage, enrochement...)	Toute l'année	Assèchement des salins ou inondations des colonies
Sols	Terrassements (remblais, excavation, reprofilage, compactage, sous-solage...)	Toute l'année	Destruction d'habitats
	Forte artificialisation des sols (bétons, goudron...), bâtiments, parkings	Toute l'année	Destruction d'habitats
	Modification chimique des sols (épandage, boues, engrais...)		Risque peu important
	Excavation importante (>2m), carrière, tunnel		Risque peu important
Végétation	Changement drastique de couvert végétal (défrichage, plantation...)		Risque peu important
Divers	Rejets (macro-déchets, lixiviats, poussières...)		Risque peu important
	Ouvrage hydraulique ou linéaire, avec ruptures de continuités écologiques		Risque peu important
	Mats, pylônes, câbles aériens, pales	Toute l'année	Collisions et percussions
	Travaux en falaise		Risque peu important
	Éclairages nocturnes		Risque peu important
	Barrières, grillages => risque si peu perméable à la circulation des espèces		Risque peu important

## Périodes de sensibilité

Saisons	Printemps			Été			Automne			Hiver		
Mois	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02
Migration prénuptiale	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Reproduction	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Migration postnuptiale	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Hivernage	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Sédentaire	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Sensibilité : ■ forte ■ moyenne ■ faible

## Facteurs de vulnérabilité/ Menaces potentielles

- ▶ Espèce coloniale : en cas de mauvaises conditions, succès reproducteur quasi-nul.
- ▶ Un unique site de nidification majeur.

## Principales pratiques susceptibles d'avoir des incidences

- ▶ Reproduction nécessite des niveaux d'eau adaptés.
- ▶ Zones d'alimentation dépendantes de la mise en eau des salins.
- ▶ Sites naturels menacés par le développement touristique, industriel et portuaire.

## Recommandations

La reproduction du Flamant rose est corrélée à la présence de lagunes saumâtres inondées et d'îlots. En 2014, le faible niveau d'eau du site historique accueillant la colonie en Camargue a entraîné le déplacement de la colonie vers les salins du Midi, dans le Gard. Cette situation pourrait amener les flamants à se reproduire sur de nouveaux sites dans les années à venir, notamment sur les salins d'Hyères, si une gestion hydraulique favorable y est mise en place. Il est donc recommandé de multiplier la présence d'îlots entourés d'eau, augmentant ainsi le nombre de sites favorables à l'accueil des flamants.

## Liens utiles

- DOCOB : [side.developpement-durable.gouv.fr](http://side.developpement-durable.gouv.fr)
- Fiches INPN : [inpn.mnhn.fr/site/natura2000/recherche](http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/recherche)
- Données naturalistes : [faune-paca.org](http://faune-paca.org) et [silene.eu](http://silene.eu)
- DREAL : [paca.developpement-durable.gouv.fr](http://paca.developpement-durable.gouv.fr)
- Bibliographie : Flitti A., Kabouche B., Kayser Y. & Olioso G. (2009). *Atlas des oiseaux nicheurs de PACA*. LPO PACA. Delachaux & Niestlé, 544 p. Patrinat (coord.), 2025 - *Résultats synthétiques de l'évaluation des statuts et tendances des espèces d'oiseaux sauvages en France, période 2019-2024*. Rapportage article 12 envoyé à la Commission européenne, novembre 2025.